

Информационный лист.

Мероприятия по предупреждению заноса вируса гриппа птиц.

В связи с регистрацией очага заболевания гриппа птиц в селе Татарская Каргала, Сакмарского района, Оренбургской области существует вероятность заноса инфекции и в наш район.

В целях предотвращения заноса гриппа птиц, владельцам птиц надо знать, что грипп птиц это остро протекающая, высококонтагиозная (заразная) болезнь домашних и диких птиц, протекает в виде эпизоотий с поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта.

Возбудитель – РНК содержащий вирус (13 серологических вариантов). На инфицированных перьях возбудитель выживает 18-20 суток. В лиофилизированном состоянии активен в течении 2-3 лет.

Вирус надежно обезвреживают 3 % растворы NaOH, хлорной извести, креолина, фенола, 2 % растворы формальдегида, азотной кислоты, хлороформа.

Эпизоотология

Источник инфекции – больная и переболевшая птица, выделяющийся во внешнюю среду вирус аэрогенно, со слюной и пометом, что создает возможность заражения птицы через воздух, инфицированный корм и воду. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Заражение может происходить через обслуживающий персонал, транспорт, оборотную тару и т.д. Доказана передача возбудителя комарами, пухо-пероedами и грызунами.

Течение и симптомы

Болезнь протекает в виде энзоотий и эпизоотий. Тяжелое течение гриппа характеризуется коротким инкубационным периодом от 1 до 7 дней и быстрым развитием болезни. У больных отмечают депрессию, малоподвижность, отек подкожной клетчатки головы и шеи, слизистые истечения из носа, хрипы, потерю чувствительности, синюшность сережек и гребня. Птица впадает в коматозное состояние и через 24-72 часа гибнет.

Что должны делать граждане, содержащие птицу у себя в подворье?:

1. Не допускать контакта своей птицы с дикой птицей;
2. Обеспечить птицу полноценным кормом, сбалансированным по питательным веществам, макро и микроэлементам и витаминам (исключить плесневелые корма);
3. Обеспечить ветеринарно-санитарное состояние в птичнике и выгульном дворе;
4. Ежедневно мыть кормушки и поилки водой с добавлением дез.раствора;
5. При появлении признаков заболевания у птицы, больную птицу изолировать, обратиться к ветеринарному врачу; или по телефону: 2-17-34. 2-17-32

ГБУ «Асекеевское районное
управление ветеринарии»

Вход. № 305 от 05.10.2022г.

Синицын К.И.
Зав. отделом
05.10.2022г.